

ESCRIBEN

raúl mendoza sassi¹
jorge umberto béria²

¹ Dto de Medicina Interna Fundación Univ. Fed. de R. Grande. Posgrado en Epidemiología. Dto de Medicina Social, U.Federal de Pelotas, Brasil

² Posgrado en Epidemiología, Dto de Medicina Social, Universidad Federal de Pelotas, y Posgrado en Salud Colectiva, Univ. Luterana. Brasil

Utilización de los servicios de salud

una revisión sistemática sobre los factores relacionados

Introducción

Al medir la utilización de los servicios, se está estudiando la accesibilidad a los mismos. No es una medida exacta, pero es la más usada en la mayoría de los estudios. Y, al estudiar la utilización-accesibilidad por grupo socioeconómico, también se está evaluando la equidad del sistema en cuestión. Así, este trabajo pretende abordar, mediante la revisión de artículos publicados sobre el tema, cuáles son los factores que afectan la utilización de los servicios de salud, cuál es el efecto que tienen y cuáles pueden ser considerados barreras o, por el contrario, facilitadores del acceso. A un determinado país, se prefirió realizar una revisión extensiva a diversos países. Si bien esto introduce un elemento de heterogeneidad, las diferencias encontradas en los efectos de un factor sobre la utilización podrán evidenciar la influencia del sistema en la utilización de los servicios de salud.

Metodología

Para realizar esta revisión sistemática, fueron utilizados los siguientes criterios de revisión de artículos:

- Tipo de estudio: estudios con diseño transversal, longitudinal, o caso-control, de base poblacional o de servicios de salud, realizados mediante muestreo aleatorio.
- Unidad de análisis: personas de todas las edades.
- Evento: consultas o internaciones medidas como variable discreta o dicotómica, ocurridas en el período máximo de un año. No fueron seleccionados artículos que se ocupasen de

la utilización de servicios por enfermedades específicas.

La búsqueda de artículos fue realizada en el Medline y en los bancos de datos de Bireme (Lilacs, Adsaúde e Medcarib), entre 1970 y 1999. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda electrónica (en la forma de descriptores o de palabras) fueron: *health services, office visits, ambulatory care, primary health care, family practice, family health*, cruzadas con *health services accessibility, accessibility*. Se utilizaron también los calificadores *statistics & numerical data* y *utilization*. El número de artículos se amplió mediante la identificación de estudios citados en revisiones, en referencias citadas en los artículos y a través de contacto con autores.

Fue creado un banco de datos en el programa Access, donde se ingresaron los artículos seleccionados. Para cada artículo, fueron extraídos: el año del estudio, el año de publicación, el número de observaciones, el tipo de diseño utilizado, el método estadístico utilizado en el análisis, las variables dependientes e independientes estudiadas, las variables utilizadas para ajuste, la prevalencia de consultas, la proporción de la población que consultó y los efectos de los factores estudiados. Finalmente, se construyeron tablas de sistematización con los campos antes señalados, lo que permitió posteriormente un análisis comparativo entre los diversos estudios. A partir de las variables identificadas, se definieron categorías analíticas en donde fueron agrupadas las diferentes variables. Las categorías definidas fueron: socioeconómica, demográfica, familiares, soporte social, necesidad en salud y características de los servicios de salud.

* Este texto se publica con autorización de los autores y la corespondiente solicitud a Cuadernos de SAudade Publica:publicación de origen

Resultados

Cobertura y promedio de consultas

En la Tabla 1, se puede observar que la cobertura de consultas en un año es muy semejante entre los países estudiados, situándose entre el 60 y el 70 por ciento.

En Tabla 2, aparece el promedio de consultas por habitante y por año. En la Tabla 3, puede observarse que entre el 10 y el 15% de las personas utilizan entre un 40 a un 50% de todas las consultas disponibles. Estas personas son los llamados hiperutilizadores, y los motivos que los llevan a este comportamiento son diversos. Demers (1995) encontró que este grupo presentaba una mayor cantidad de problemas sicosomáticos y síntomas mal definidos. Otros factores envueltos son la mayor carga de morbilidad y la mayor edad).

Factores demográficos

Edad

Los grupos extremos (niños y ancianos) utilizan más los servicios que los otros grupos de edad, y esto ocurre independientemente del país en cuestión, como muestran los estudios realizados en los Estados Unidos, por Anderson & Aday (1978), Parkerson et al. (1995b), Salber et al. (1976), Wan & Soifer (1974), Wolinski (1978); en Italia, por Mapelli (1993); en Irlanda, por Nolan (1994); en Curaçao, por Alberts et al.

nino se asoció positivamente con la utilización de servicios de salud. Además, el uso es mayor en la edad fértil, como muestran los trabajos de Bucket & Curtis (1986) y de Beland (1988), lo que sugiere una mayor utilización por motivos obstétricos o ginecológicos.

Tamaño-estructura familiar

El tamaño de la familia o el número de hijos también parece influenciar la utilización de consultas, pero los resultados no son consistentes, habiendo inclusive estudios que muestran efectos opuestos. Zastowny et al. (1989), en los Estados Unidos, observaron que personas pertenecientes a familias numerosas consultaron más. Al contrario, Andersen & Lake (1983), en Noruega, encontraron que, después de ajustar para otras variables como necesidad en salud, una familia grande determinó una menor utilización. La estructura familiar puede ser otro factor que afecta la utilización, pero nuevamente el sentido del efecto depende del país en cuestión. Wolfe (1980) en los Estados Unidos encontró que los niños de familias monoparentales consultaron menos que los otros niños. Ya Balarajan et al. (1992) y Judge & Benzeval (1993), en Inglaterra, observaron un efecto contrario, sien-

(1997); en España, por Bellon-Saameno et al. (1995) y en Brasil, por Cesar & Tanaka (1996) y Costa & Facchini (1997). Un estudio realizado por CaInan et al. (1994) con adultos, en cuatro países (Inglaterra, Grecia, Rusia y Yugoslavia), también mostró que la utilización de consultas aumentó conforme lo hizo la edad. El efecto es pequeño, como muestran Anderson & Aday (1978), Bellon-Saameno et al. (1978) y Wolinski (1978). En personas de 50 años o más, después del ajuste con otras variables como necesidad en salud, Costa & Facchini (1997), en Pelotas, Brasil, observaron que estas personas tenían un riesgo relativo (RR) 10 a 15% mayor para consultar.

Sexo-género

Las mujeres utilizan más los servicios, aun después del ajuste con necesidad en salud. Krasnik et al. (1997), en Dinamarca, encontraron que luego de controlar para variables demográficas, socioeconómicas y de necesidad en salud, el sexo femenino se asoció significativamente con la posibilidad de consultar (*Odds Ratio* = OR 1,76; IC 95%: 1,42-2,18). En el Brasil, Costa & Facchini (1997) también encontraron esta asociación (OR 1,84; IC 95%: 1,73-1,95). En el mismo país, pero en la población de personas con 60 años o más, Pinheiro & Travassos (1999) vieron que el sexo feme-

do que los niños pertenecientes a este tipo de familia consultaron en mayor proporción que los hijos de madres con marido presente en la casa. Si esta variable está asociada con la clase social -como frecuentemente ocurre- esta diferencia puede estar hablando de la equidad del sistema de salud en el país en cuestión, como veremos más adelante.

Factores socioeconómicos

Factores como clase social, ingreso, educación, desempleo, etnia o raza, afectan la utilización de los servicios de salud. Pero la dirección del efecto depende mucho del país en cuestión.

Clase social-ingreso

Adler et al. (1993), Freeborn et al. (1977), Judge & Benzeval (1993), Kaplan et al. (1996) y Yuen et al. (1990), entre otros, mostraron que las clases más bajas tienen una mayor morbilidad y mortalidad. En el Brasil en particular, Travassos et al. (1995) vieron que la morbilidad referida aumentó inversamente al ingreso familiar *per capita*. Con respecto a la relación entre necesidad y utilización, Andersen & Aday (1978), Wan & Soifer (1974) y Fernández-de-la-Hoz & Leon (1996), entre otros autores, encontraron que la mayor utilización en

Tabla 1

Cobertura de consultas en un año para diversos países.

Autor	País	Tipo de médico	Cobertura (%)
Solber et al. (1976)	Estados Unidos	Todos	Blancos 70.0/Negros 65.0
Fylkesnes (1993)	Noruega	Médico general	62.7
Nolan (1994)	Irlanda	Médico general	60.3
Costa & Facchini (1997)	Brasil	Todos	70.0

Tabla 2

Promedio de consultas médicas por persona/año para diversos países.

Autor/Año	País	No. de consultas
Solber et al. (1976)	Estados Unidos	Blancos 3.8/Negros 2.8
Mapelli (1993)	Italia	4.3
Alberts et al. (1997)	Curazao	3.3
Costa & Facchini (1997)	Brasil	3.0

Tabla 3

Proporción de la población que utilizó más consultas y proporción del total de consultas que realizó. Diversos países.

Autor/Año	País	% de población	% del total de consultas
Brown et al. (1982)	Canadá	13	46
Kokki & Laaman (1989)	Finlandia	14	50
Freeborn et al. (1990)	Estados Unidos	12	50
Mapelli (1993)	Italia	10	41
Bellón-Saamano et al. (1995)	España	15	43

estos grupos estaría mediada por una necesidad en salud más acentuada. Así, la relación entre la utilización por estos grupos y los grupos más favorecidos es un indicador de la equidad del sistema. Los estudios muestran que esta relación cambia según el país y el momento del estudio, conforme se verá a seguir.

Balarajan et al. (1987), en Inglaterra, Roos & Shapiro (1981), en Canadá, y Nolan (1994), en Irlanda, mostraron que la clase más pobre se asoció significativamente con la posibilidad de consultar e internar. Con el desempleo ocurrió la misma situación, y Yuen & Balarajan (1989), en Inglaterra, encontraron que la categoría desempleada tenía una asociación significativa con la utilización de consultas, aun después de ajustar para tiempo de duración de la enfermedad (OR 1,53; IC 95%: 1,34-1,76). Esto estaría mostrando la existencia de equidad en la utilización entre los grupos sociales en estos países. Pero el artículo de Haynes (1991), realizado en el mismo país, que muestra que, en la región rural, el grupo sin automóvil tuvo una utilización menor, podría estar indicando la existencia de inaccesibilidad geográfica, al menos para este grupo en particular. Recientemente, Schoen et al.

(2000) encontraron que, en Canadá e Inglaterra, los indicadores de acceso, entre el grupo con ingreso mayor a la media comparado con el grupo menor, no fueron diferentes. Por el contrario, en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, encontraron uso 2 a 3 veces mayor en el grupo de mayor ingreso. La inequidad se puede reflejar también en la utilización de consultas preventivas.

Freeborn et al. (1977), en los Estados Unidos, vieron que, entre las mujeres de 40 a 59 años, el grupo de mayor ingreso tuvo una asociación significativa con consultas preventivas. Lo mismo fue observado por Borrell et al. (1999), en España, donde 61% de las mujeres de la clase social alta realizaron exámenes preventivos para cáncer de cuello de útero, comparados con 32% de la clase más baja. También el Black Report (Black et al., 1988) describe cómo, en Gran Bretaña, las mujeres de las clases sociales I y II utilizaron más consultas preventivas (consultas prenatales y dentistas) que las clases inferiores.

Con respecto a las internaciones, Titkow (1983), en Polonia, observó una asociación positiva entre nivel de ingreso e internación. Fernández-de-la-Hoz & Leon (1996), en España,

observaron que, entre las personas con autopercepción de salud pobre, la categoría de mayor ingreso estaba significativamente asociada con la internación (OR 1,67; IC 95%: 1,15-2,44). El estudio de Borrell et al. (1999), también en España, pero realizado unos años más tarde, no encontró diferencia en el grado de utilización de consultas e internaciones, sugiriendo que los cambios en el sistema de salud de ese país habrían surtido efecto.

En China, el estudio de Liu et al. (1999) mostró que la brecha en la utilización de servicios entre grupos de diferente ingreso aumentó entre 1985 y 1993, coincidiendo con las reformas en el sistema. En el Brasil, tres estudios muestran la existencia de inequidad, a pesar de los cambios introducidos. El estudio de Costa & Facchini (1997), en Pelotas, sur del Brasil, encontró que la clase social baja tuvo 25% menos de chances de consultar (RR 0,74; IC 95%: 0,69-0,84). De la misma forma, el estudio de Pinheiro & Travassos (1999), en Río de Janeiro, encontró que el ingreso familiar *per capita* se asoció positivamente con la utilización de servicios de salud entre la población de 60 años o más. Finalmente, el estudio de Almeida et al. (2000) también encontró que hay evidencias de inequidad en la utilización y el acceso a los servicios, a pesar de las medidas de regulación introducidas.

Educación

Con respecto a la educación, varios artículos muestran la asociación positiva entre años de estudio y utilización. Salber et al. (1976), en los Estados Unidos, notaron que, cuanto mayor la educación, mayor el número de consultas realizadas. En Inglaterra, Oakley et al. (1993) encontraron que las mujeres con mayor número de años de estudio consultaron después del parto con mayor frecuencia que las mujeres con menor educación. En San Pablo, Brasil, Cesar & Tanaka (1996) vieron que las personas pertenecientes a jefes de familia con más años de educación consultaron en mayor proporción. También Suárez (1992), en el mismo lugar, vio que, entre los niños menores de un año, el grupo de hijos de madres con mayor escolaridad se asoció significativamente con la mayor utilización de consultas (OR 3,41; IC 95%: 1,02-11,33). Pero algunos artículos encontraron una asociación inversa entre educación y uso. Es el caso de La Vecchia et al. (1989), en Italia, que encontraron que las personas con mayor estudio tenían un RR de 0,79 (IC 95%: 0,74-0,85) de consultar el médico una vez y un RR de 0,51 (IC 95%: 0,45-0,58) de consultar dos veces o más, comparados con el grupo de personas con menor educación. Otros, como Pinheiro & Travassos (1999), no encontraron ninguna asociación en el grupo de 60 años o más. Ya cuando el resultado analizado

son las visitas preventivas, la educación tiene consistentemente un efecto positivo sobre la utilización. Es lo que muestran los artículos de Borrás et al. (1999), Borrell et al. (1999), Breen & Kessler (1994), Calle et al. (1993), Coughlin et al. (1999), Katz & Hofer (1994) y Zapka et al. (1989). Todos encontraron una asociación significativa entre las dos variables, aun después del ajuste para otros factores.

Raza-etnia

Salber et al. (1976), en Estados Unidos, encontraron que, aun después de estratificar por ingreso, la población negra utilizaba más los servicios públicos, en cuanto la población blanca hacía mayor uso de los servicios privados. Trece años más tarde y en el mismo país, Zastowny et al. (1989) encontraron el mismo resultado. Parkerson et al. (1995a), también en los Estados Unidos, observaron que, durante 18 meses de seguimiento, el grupo de mujeres blancas se asoció significativamente con la utilización de seis consultas o más, cuando comparadas con las mujeres negras, pero no controló para ninguna variable socioeconómica. Estas diferencias del efecto de los factores socioeconómicos entre los países estudiados (a veces asociándose con menor utilización, otras veces con mayor utilización) muestran el efecto modificador del sistema de salud vigente. En países con políticas que contemplan la mayor necesidad de los grupos menos favorecidos -como es el caso de Inglaterra y Canadá por ejemplo- la equidad se manifiesta por la mayor utilización de los servicios por parte de estos grupos.

Familia y soporte social

Parkerson et al. (1995b), al estudiar el efecto de la utilización de consultas, encontraron que, controlando para edad, sexo y raza las pacientes que realizaban seis visitas médicas o más, tenían mayor stress familiar; el efecto fue significativo, pero muy pequeño (OR 1,02). De la Revilla & De los Ríos (1994), en España, encontraron que los grandes utilizadores de los servicios de salud (definidos como las personas que utilizaban 9 o más consultas por año) tenían un RR de 6,5 de pertenecer a una familia disfuncional (IC 95%: 3,95-10,67). Pero el autor no ajustó para otras variables, como edad o sexo, que podrían estar confundiendo. Gómez-Rodríguez et al. (1996), en el mismo país, vieron que pacientes provenientes de un área con situación económica precaria tenían más disfunción familiar y consultaban con mayor frecuencia que los pacientes de otra rea con mejor situación socioeconómica. Pero tampoco controlaron para las variables demográficas. Así entonces, el efecto del stress familiar sobre la utilización de los servicios de salud puede, en realidad, estar siendo confundido por otras variables no contro-

ladas en los estudios realizados.

Con respecto al efecto de la red social sobre el uso de consultas, Krasnik et al. (1997) encontraron que, después de ajustar para factores demográficos y socioeconómicos, la categoría de individuos con menor soporte social (escore de 0 a 3) tuvo una asociación significativa con la menor utilización de los servicios de salud (OR 0,63; IC 95%: 0,44-0,91), cuando comparada con otros grupos.

Características de los Servicios de Salud

Distancia –recursos existentes

Algunas características de los servicios de salud pueden afectar la utilización. La distancia entre la casa y el servicio de salud es un factor frecuentemente estudiado por su importancia en el contexto el acceso. Sin embargo, Andersen & Laake (1983), Carr-Hill et al. (1996), Fylkesnes (1993), Krasnik et al. (1997), Wan & Soifer (1974) y Costa & Facchini (1997) no encontraron un efecto significativo. Los estudios fueron realizados en países con una razonable red de atención, lo que puede explicar este resultado. Ya otros países con áreas montañosas o topografía difícil pueden presentar dificultades en la accesibilidad física a los servicios de salud, como es el caso de algunas regiones de Bolivia (Perry & Gesler, 2000). También puede ocurrir esta asociación cuando se estudian determinados grupos de población que pueden ser particularmente afectados por la distancia, como en el caso de las personas de edad (Nemet & Bailey, 2000).

El número de médicos por habitante es otra variable usada para estudiar las características de los servicios de salud en lo que se refiere a la disponibilidad de recursos. De los artículos de Andersen & Aday (1978), Fylkesnes (1993) y Mapelli (1993), solamente este último mostró una asociación significativa, tal vez por haber incluido la zona rural, donde generalmente la proporción de médicos por habitante es menor.

Seguro de salud

El efecto que tiene el factor seguro de salud sobre la utilización es consistente, y la utilización es mayor entre las personas que tienen esta característica. Andersen & Aday (1978), Kronenfeld (1978) y Wan & Soifer (1974), en los Estados Unidos, encontraron que, ajustando para variables demográficas, socioeconómicas y de necesidad en salud, las personas con seguro de salud consultaban con mayor frecuencia. Más recientemente, Rosenbach et al. (1999) encontraron que niños con seguro tenían más chances de visitas con el médico y menos chances de visitas en la emergencia. En España, Borrás et al. (1999) vieron que las mujeres con seguro de salud privado tenían mayor probabilidad de realizar prevención del cáncer de cuello uterino, aun después de ajustar pa-

ra educación. Así, el factor seguro de salud no solamente incrementaría el uso de consultas en general, como también determinaría una mayor utilización de los servicios preventivos.

Médico definido

El hecho de tener un médico definido o un local de consulta definido está asociado también con una mayor utilización. Los investigadores que utilizaron esta variable, como Alpert et al. (1970), Andersen & Aday (1978), Becker et al. (1974b), Dietrich & Marton (1982) y Hayward et al. (1991), encontraron que este fue uno de los factores más importantes en la determinación de la utilización. El tener un médico definido también puede ser considerado como un elemento de la calidad de la atención, vinculado a la continuidad de la asistencia y de la relación médico paciente, conforme explica Donahedian (1984). La prevalencia de médico definido, en los Estados Unidos, se sitúa entre 70 y 80%, como muestran los trabajos de Hayward et al. (1991), Lambrew et al. (1996), Lave et al. (1979) y Mainous & Gill (1998). En el Brasil, el estudio de Stein (1998) mostró que un 30% de los pacientes entrevistados referían tener un médico definido. Wasson et al. (1984), en los Estados Unidos, vieron que personas con 55 años o más que recibieron cuidados del mismo médico durante 18 meses de seguimiento tuvieron menor número de internaciones de emergencia y menor cantidad de días de internación. Lambrew et al. (1996), en el mismo país, encontraron que, ajustando para edad, sexo, raza, seguro de salud, educación, ingreso, empleo y necesidad en salud, la categoría con médico definido se asoció significativamente con la posibilidad de consultar, cuando comparada con las que no tenían ni médico definido, ni un local definido para consultar (OR 1,97; IC 95%: 1,58-2,45). Con respecto a la relación entre médico definido y la utilización de los servicios de emergencia, Sox et al. (1998) encontraron que, después de ajustar para otras variables (demográficas, socioeconómicas, seguro de salud y número de enfermedades crónicas), la categoría sin médico definido se asoció significativamente con la utilización de los servicios de emergencia (OR 1,8; IC 95%: 1,4-2,4). Por otro lado, Baker et al. (1994) vieron que las personas que identificaban al servicio de emergencia como su lugar habitual de consulta hicieron menos consultas médicas que aquellas personas que tenían un local definido diferente al servicio de emergencia (1,8 consultas vs 2,4 consultas; $p < 0,001$).

Finalmente, sobre la asociación entre médico definido y consultas preventivas, los dos artículos de Becker -Becker et al. (1974a, 1974b)- no mostraron diferencias significativas. Gordis & Markowitz (1971) y Spivack et al (1980) tampoco

encontraron diferencias. Pero otros estudios sí encontraron una asociación significativa. Alpert et al. (1970) encontraron que niños con médico definido realizaban más consultas preventivas y menos por enfermedad. Kirkman-Lift & Kronenfeld (1992) vieron que quien tenía una fuente regular de cuidados médicos tenía una mayor probabilidad de realizar una mamografía. Otros aspectos relacionados con la calidad de la atención parecen estar afectados por la continuidad del cuidado médico, operacionalizado como médico definido. Forrest & Star-field (1998) encontraron que quien tenía continuidad en la atención presentaba una menor probabilidad de esperar más tiempo por la consulta. De la misma forma, Sox vio que el grupo sin médico definido tuvo una asociación significativa con la variable demora para consultar (OR 1,6; IC 95%: 1,2- 2,1), cuando comparado con el grupo con esta característica. Con respecto a la raza, el estudio de Lave et al. (1979), también en los Estados Unidos, observó que, después de ajustar para las variables ingreso y educación, los negros tenían mayor probabilidad de no tener esta característica. Por todo lo visto hasta ahora, el factor médico definido puede ser considerado como uno de los factores más importantes en la determinación de la utilización. Las personas con esta característica utilizan de forma más adecuada los servicios de salud, y su presencia puede ser considerada como un marcador de la calidad de la atención.

Necesidad en salud

Puede ser medida a través de informaciones médicas directas o indirectas (registros), o ser referida por la persona (morbilidad referida). En este último caso se puede medir por la auto percepción de salud, por el número de síntomas, por el número de enfermedades crónicas padecidas o por el número de días restringidos para las actividades normales debido a la enfermedad, entre otras.

atención recibida no necesita volver a visitar médico, lo que disminuye el número de consultas en este grupo. En la Tabla 4 se presentan algunos de los factores asociados a la utilización de servicios y a sus respectivas medidas de efecto, identificados a partir de los artículos revisados.

Algunas consideraciones sobre las relaciones jerárquicas entre las diferentes categorías

Si representásemos las diferentes categorías estudiadas según su localización jerárquica con respecto a la variable dependiente (utilización de servicios de salud) tendríamos los que se observa en la Figura 1. Las categorías más distantes con

Los estudios de Andersen & Aday (1978), Antonovsky et al. (1989), Conelly & Smith (1991), Fylkesnes (1993), Mapelli (1993), Fernández- Mayoralas et al. (2000) y Wan (1982) encontraron una asociación significativa con la utilización, siendo esta siempre el factor principal. En el Brasil, el estudio de Pinheiro & Travassos (1999) mostró que, en el grupo de 60 años o más, la morbilidad referida fue el factor más importante en la explicación de la variación de la utilización de servicios de salud (OR 4,35; $p < 0,001$). Fernández-de-la-Hoz & Leon (1996), Parkerson et al. (1995b) y Roos Shapiro (1981) encontraron una relación directa y una tendencia lineal entre los diferentes niveles de necesidad (medida por la auto percepción en salud) y la utilización de servicios. También hay una relación entre la auto percepción de salud baja y la salud mental, como muestra el estudio de Conelly et al. (1989), donde pacientes con salud pobre tenían mayor depresión, ansiedad y preocupación por su estado de salud.

Satisfacción

La satisfacción del usuario es, sin lugar a dudas, otra de las variables que afecta la utilización de los servicios de salud, pero también puede ser estudiada como variable dependiente, porque hay entre las dos variables causalidad reversa. Uno de los artículos que aborda la cuestión desde este último punto de vista sugiere que la satisfacción depende del contexto del proveedor de servicios y de las características individuales, habiendo por tanto mucha variabilidad (Zastowny et al., 1989). Los autores encontraron una asociación inversa entre utilización y satisfacción en el grupo de raza blanca. Esto puede significar que las personas que no quedan satisfechas con la atención deben consultar nuevamente, aumentando, por lo tanto, el número de consultas realizadas en este grupo. Al contrario, quien queda satisfecho con la

respecto a la variable dependiente están representadas en la parte superior de la figura. En la medida que se desciende, se pasa a categorías que se relacionan más próximamente con el resultado estudiado. Las categorías localizadas superiormente ejercen sus efectos (totales o parciales) sobre la variable dependiente, directamente o a través de las categorías situadas por debajo de ellas.

La categoría socioeconómica y la categoría factores demográficos estarían en el primer nivel. En un segundo nivel podrían aparecer la categoría familia (con variables como stress familiar, familia extendida y familia monoparental), la cate-

Tabla 4

Algunos factores asociados a la utilización de servicios, según país y medidas de efecto.

Autor/Año	País	Tipo de utilización	Factor	Medida del efecto ¹ OR (IC 95%)
Krasnik et al. (1997)	Dinamarca	Consultas	Sexo femenino	1.76 (1.42-2.18)
Costa & Facchini (1997)	Brasil	Consultas	Sexo femenino	1.84 (1.73-1.95)
Costa & Facchini (1997)	Brasil	Consultas	Clase social baja	0.74 (0.69-0.84) ²
Borrell et al. (1999)	España	Sin visita preventiva	Clase social baja	4.74 (1.68-13.41)
Fernandez-de-la-Hoz & Leon (1998)	España	Internación	Mayor ingreso	1.67 (1.15-2.44)
Suarez (1992)	Brasil	Consultas	Mayor educación	3.41 (1.02-11.33)
La Vecchia et al. (1989)	Italia	Consultas	Mayor educación	0.79 (0.74-0.85)
Yuen & Balarajan (1989)	Inglaterra	Consultas	Desempleo	1.53 (1.34-1.76)
Krasnik et al. (1997)	Dinamarca	Consultas	Mujer bajo soporte social	0.63 (0.44-0.91)
Lambrose et al. (1996)	Estados Unidos	Consultas	Médico de familia	1.97 (1.58-2.48)
Mapelli (1993)	Italia	Medida de consultas	Salud pobre/Salud excelente	7.4/2.5 ³
Pinhoiro & Travassos (1990)	Brasil	Consultas/Internaciones	Problema de salud	4.35 (p = 0.001)

¹ Odds ratio y intervalo de confianza 95% ajustados para diversas variables, dependiendo del estudio (ver texto).

² Razón de prevalencias.

³ Médios.

Figura 1

Relación jerárquica de los diferentes conceptos analíticos relacionados a la utilización de los servicios de salud.



goría red social (con la variable soporte social) y la categoría eventos estresantes.

En el tercer nivel estarían las categorías característica de los servicios de salud, la necesidad en salud y el comportamiento en la búsqueda de cuidados médicos (definida a través de algunas características y conductas que la persona tiene frente a la enfermedad). Esta última variable ha sido muy estudiada en las madres de niños con algunas enfermedades infecciosas comunes (Vos, 1994) y se vio que afecta la utilización. Finalmente, en el cuarto nivel, se encontraría la variable satisfacción del usuario, una variable que guardaría una relación de causalidad reversa con la variable dependiente y,

por este motivo, estaría representada con líneas discontinuas.

Conclusiones

La cobertura de consultas anuales muestra similitud entre los diversos países estudiados, así como el promedio de consultas por año y la proporción de la población que utiliza más los servicios de salud. Entre los factores demográficos, se observó que las edades extremas y el sexo femenino utilizan más los servicios de salud. El tamaño y la estructura familiar están asociados a la utilización, pero la dirección del efecto depende del país en estudio.

Los factores socioeconómicos determinan la utilización de

los servicios de salud, principalmente a través de las categorías necesidad en salud y característica de los servicios de salud. Los grupos más pobres, los cuales tienen una mayor carga de enfermedad, tienden a utilizar menos los servicios de salud, si la accesibilidad al sistema no les es favorable. Nuevamente, las diferencias observadas entre grupos de países manifiestan la importancia de las políticas y los sistemas de salud. En países con sistemas donde la accesibilidad es universal, como Inglaterra o Canadá, las personas de clase baja tienen mejor acceso a los servicios. Entre las características familiares, personas provenientes de familias disfuncionales realizan más consultas. Entre los factores considerados en la categoría servicios de salud, la distancia al servicio y el mayor número de médicos por habitante aumentan la utilización. Las personas que poseen seguro de salud voluntario tienden a utilizar más los servicios de salud. Pero, como esta característica está asociada al mayor ingreso, favorece la utilización apenas en los grupos menos necesitados, alimentando de esta manera la inequidad.

Otro de los factores de la categoría servicios de salud es el médico definido. Este factor tiene un importante efecto en la determinación de la utilización. Las personas que tienen esta característica, no solo utilizan más los servicios de consulta e internan menos veces, como también utilizan los servicios de emergencia, cuando tienen realmente un motivo urgente. Otros factores que tendrían importancia en la determinación de la utilización los servicios de salud son el comportamiento en la búsqueda de cuidados médicos -que refleja los aspectos de cómo la persona reacciona frente a la enfermedad- y los eventos estresantes, que pueden determinar una mayor utilización en función de una mayor necesidad en salud. Con respecto al primer factor, hay estudios que muestran que las clases más bajas no perciben la necesidad de consultar de la misma forma que las clases más altas (Fraser, 1992). Habría que considerar medidas de educación específicas para estos grupos que promoviesen cambios en las actitudes frente a la enfermedad. Finalmente hay que considerar la satisfacción del usuario.

Referencias

- Adler, N.; Boyce, W.; Chesney, M.; Folkman, S. & Syme, L., 1993. "Socioeconomic inequalities in health. No easy solution". *JAMA*, 269:3140-3145.

- Alberts, J. E.; Sanderman, R.; Eimers, J. M. & Van Der Heuvel, W. J. A., 1997. "Socioeconomic inequity in health care: A study of services utilization in Curaçao". *Social Science and Medicine*, 45:213-220.

- Almeida, C.; Travassos, C.; Porto, S. & Labra, M., 2000. "Health sector reform in Brazil: A case study of inequity". *International Journal of Health Services*, 30:129-162.

- Alpert, J. J.; Kosa, J. I.; Haggerty, R. J.; Robertson, L. S. & Meagarty, M. C., 1970. "Attitudes and satisfactions of low-income families receiving comprehensive pediatric care". *American*

Journal of Public Health, 60:499-506.

- Andersen, A. S. & Laake, P., 1983. "A causal model for physician utilization: Analysis of Norwegian data". *Medical Care*, 21:266-278.

- Andersen, R. & Aday L. A., 1978. "Access to medical care in the US: Realized and potential". *Medical Care*, 16:533-546.

- Antonovsky H.; Maoz, B.; Pilpel, D. & Arad, T., 1989. "Personal and health factors associated with frequency of visits to the primary health clinic". *Family Practice*, 6:182-187.

- Baker, D. W.; Stevens, C. D. & Brook, R. H., 1994. "Regular source of ambulatory care and medical care utilization by patients presenting to a Public Hospital Emergency Department". *JAMA*, 271: 1909-1912.

- Banks, M.; Beresford, S.; Morrell, D.; Waller, J. & Watkins, C., 1975. "Factors influencing demand of primary medical care in women aged 20-44: A preliminary report". *International Journal of Epidemiology*, 4:189-195.

- Becker, M. H.; Drachman, R. H. & Kirscht, J. P., 1974a. "A field experiment to evaluate various outcomes of continuity of physician care". *American Journal of Public Health*, 64:1062.

- Becker, M. H.; Drachman, R. H. & Kirscht, J. P., 1974b. "Continuity of pediatricians: New support for an old shibboleth". *Medical Care*, 84:599.

- Beland, F., 1988. "Utilization of health services as events: An exploratory study". *Health Services Research*, 23:295-310.

- Bellon-Saameno, J.; Delgado-Sanchez, A.; Luna-Del-Castillo, J. D. & Lardelli-Claret, P., 1995. "Influence of age and sex on various types of utilization of the primary health care". *Gaceta Sanitaria*, 9:343-353.

- Black, D.; Townsend, P.; Davidson, N. & Whitehead, M., 1988. *Inequalities in Health: The Black Report and the Health Divide*. London: Penguin Books.

- Borrás, J. M.; Guillen, M.; Sanchez, V.; Junca, S. & Vicente, R., 1999. "Educational level, voluntary private health insurance and opportunistic cancer screening among women in Catalonia (Spain)". *European Journal of Cancer Prevention*, 8:427-434.

- Borrell, C.; Rohlfs, I.; Ferrando, J.; Pasarin, M. I.; Dominguez-Berjon, E. & Plasencia, A., 1999. "Social inequalities in perceived health and the use of health services in a Southern European Urban Area". *International Journal of Health Services*, 29:743-764.

- Breen, N. & Kessler, L., 1994. "Changes in the use of screening mammography: Evidence from the 1987 and 1990 national health interview survey". *American Journal of Public Health*, 84:62-67.

- Brown, G. B.; Humphrey, B.; Pallister, R.; Brown, J. A. & Shetzer, L., 1982. "Prevalence and characteristics of frequent attenders in a prepaid Canadian Family Practice". *Journal of Family Practice*, 14:63-71.

- Bucket, D. & Curtis, S., 1986. "Socio demographic variation in perceived illness and the use of primary care: the value of community survey data for primary care service planning". *Social Science and Medicine*, 23:737-744.

- Calle, E. & Al, E., 1993. "Demographic predictors of mammography and pap smear screening in US women". *American Journal of Public Health*, 83:53-60.

- Calnan, M.; Williams, S.; Ramic, H. & Prokhorskas, R. O., 1994. "Major determinants of consumer satisfaction with primary care in different health systems". *Family Practice*, 11:468-478.

- Carr-Hill, R. A.; Rice, N. & Roland, M., 1996. "Socioeconomic determinants of rates of 58 consultation in general practice based on Fourth National Morbidity Survey of General Practices". *BMJ*, 312: 1008-1012.

- Cesar, C. & Tanaka, O., 1996. "Household Surveys as an evaluation tool for health services: A case study from the Southeast Region of the Greater São Paulo Metropolitan Area, 1989-1990". *Cadernos de Saúde Pública*, 12 (Sup. 2):59-70.

- Connelly, J. E.; Philbrick, J. T.; Smith, J. R. & Kaiser, D. L., 1989. "Health perceptions of primary care patients and the influence on health care utilization". *Medical Care*, 27:S99-S109.

- Connelly, J. E. & Smith, G. R., 1991. "Healthy patients who perceive poor health and their use of primary care services". *Journal of General Internal Medicine*, 6:47-51.

- Costa, J. D. & Facchini, L. A., 1997. "Utilização de serviços ambulatoriais em Pelotas: Onde a população consulta e com que frequência". *Revista de Saúde Pública*, 31:360-369.

- Coughlin, S. S.; Uhler, R. J. & Blackman, D. K., 1999. "Breast and cervical cancer screening practices among American Indian and Alaska native women in the United States, 1992-1997". *Preventive Medicine*, 29:287-295.

- De la Revilla, L. & De los Ríos, A. M., 1994. "The utilization of health services and the motives for consultation as indicators of family dysfunction". *Atención Primaria*, 13:73-76.

- Demers, M., 1995. "Frequent users of ambulatory health care in Quebec: The case of doctor-

- shoppers". *Canadian Medical Association Journal*, 153: 37-42.
- Dietrich, A. J. & Marton, K. I., 1982. "Does continuous care from a physician make a difference?". *Journal of Family Practice*, 15:929.
- Donabedian, A., 1984. *La Calidad de la Atención Médica. Definición y Métodos de Evaluación*. México, DF: La Prensa Médica Mexicana.
- Fernández-de-la-Hoz, K. & Leon, D. A., 1996. "Self-perceived health status and inequalities in use of health services in Spain". *International Journal of Epidemiology*, 25:593-603.
- Fernández-Mayoralas, G.; Rodríguez, V & Rojo, E., 2000. "Health services accessibility among Spanish elderly". *Social Science and Medicine*, 50:17-26.
- Forrest, C. B. & Starfield, B., 1998. "Entry into primary care and continuity: The effects of access". *American Journal of Public Health*, 88:1330-1336.
- Fraser, C., 1992. "Setting the scene". In: *Clinical Method. A General Practice Approach* IR. C. Fraser, (ed.), pp. 1-24, Cambridge: Butterworth Heinemann.
- Freeborn, D. K.; Pope, C. R. & Davis, M. A., 1977. "Health status, socioeconomic status and utilization of outpatient services for members of a pre-paid group practice". *Medical Care*, 15:115-128.
- Freeborn, D. K.; Pope, C. R.; Mulloy, J. P. & Mcfar-Land, B. H., 1990. "Consistently high users of medical care among elderly". *Medical Care*, 28:527-540.
- Fylkesnes, K., 1993. "Determinants of health care utilization - visits and referrals". *Scandinavian Journal of Social Medicine*, 21:40-50.
- Gomez-Rodríguez, E.; Gervás, J.; Hernández, M. M. & Moreno, R. B., 1996. "Socioeconomic status, chronic morbidity and health services utilization by families". *Family Practice*, 13:382-385.
- Gordis, L. & Markowitz, M., 1971. "Evaluation of the effectiveness of comprehensive and continuous pediatric care: Part I. Effectiveness of comprehensive care in influencing infant health". *Pediatrics*, 48: 766.
- Hart, J., 1971. "The inverse care law". *Lancet*, 1:405-412.
- Haynes, R., 1991. "Inequalities in health and health service use: Evidence from the general household survey". *Social Science and Medicine*, 33:361-368.
- Hayward, R. A.; Bernard, A. M.; Freeman, H. E. & Corey, C. R., 1991. "Regular source of ambulatory care and access to health services". *American Journal of Public Health*, 81:434-438.
- Judge, K. & Benzeval, M., 1993. "Health inequalities: New concerns about children of single mothers". *BMJ*, 306:677-680.
- Kaplan, G.; Parnuk, E.; Lynch, J.; Cohen, R. & Balfour, J., 1996. "Inequality in income and mortality in the United States: Analysis of mortality and potential pathways". *BMJ*, 312:999-1003.
- Katz, S. & Hofer, T., 1994. "Socioeconomic disparities in preventive care persist despite universal coverage". *JAMA*, 272:530-534.
- Kekki, P. & Laamen, R., 1989. "Análisis del uso y cobertura de una población de un distrito de atención en Finlandia. Un enfoque epidemiológico". *Atención Primaria*, 6:540-546.
- Kirkman-Lift, B. & Kronenfeld, J., 1992. "Access to cancer screening services for women". *American Journal of Public Health*, 82:733-735.
- Kleinman, J. C.; Gold, M. & Makuc, D., 1981. "Use of ambulatory medical care by the poor: Another look at equity". *Medical Care*, 19:1011-1029.
- Krasnik, A.; Sawitz, A.; Keiding, N. & Hansen, E., 1997. "Determinants of general practice utilization in Denmark". *Danish Medical Bulletin*, 44:542-546.
- Kronenfeld, J. J., 1978. "Providers variables and the utilization of ambulatory care services". *Journal of Health and Social Behavior*, 19:68-76.
- La Vecchia, C.; Negri, E.; Pagano, R. & Decarl, A., 1989. "Education, prevalence of disease and frequency of health care utilization: The 1983 Italian National Health Survey". *Journal of Epidemiology and Community Health*, 41:161-163.
- Lambrew, J. M.; Defriese, G. H.; Carey T. S.; Rick-Etts, T. C. & Biddle, A. K., 1996. "The effects of having a regular doctor on access to primary care". *Medical Care*, 34:138-151.
- Last, J., 1963. "The iceberg: Completing the clinical picture in general practice". *Lancet*, 2:28-31.
- Lave, J. R.; Lave, L. B.; Leinhardt, S. & Nagin, D., 1979. "Characteristics of individuals who identify a regular source of medical care". *American Journal of Public Health*, 69:261-267.
- Lima, M. S.; Béria, J. U.; Tomasi, E.; Conceição, A. T. & Mari, J. J., 1996. "Stressful life events and minor psychiatric disorders: An estimate of the population attributable fraction in a Brazilian community-based study". *International Journal of Psychiatry in Medicine*, 26:211-222.
- Liu, Y.; Hsiao, W. C. & Eggleston, K., 1999. "Equity in health and health care: The Chinese experience". *Social Science and Medicine*, 49:1349-1356.
- Mainous, A. G. & Gill, J. M., 1998. "The importance of continuity of care in the likelihood of future hospitalization: Is site of care equivalent to a primary clinician?". *American Journal of Public Health*, 88:1539-1541.
- Mapelli, V., 1993. "Health needs, demand for health services and expenditure across social groups in Italy: An empirical investigation". *Social Science and Medicine*, 36:999-1009.
- Merzel, C., 2000. "Gender differences in health care access indicators in an urban, low-income community". *American Journal of Public Health*, 90:909-916.
- Nemet, G. E. & Bailes A. J., 2000. "Distance and health care utilization among the rural elderly". *Social Science and Medicine*, 50:1197-1208.
- Newacheck, P. W., 1988. "Access to ambulatory care for poor persons". *Health Services Research*, 23:401-419.
- Nolan, B., 1994. "General practitioner utilization in Ireland: The role of socioeconomic factors". *Social Science and Medicine*, 38:711-716.
- Novaes, H., 1996. "Epidemiology and assessment of health care services: New research trends". *Cadernos de Saúde Pública*, 12(Sup.2):7-12.
- Oakley A.; Rigby, A. S. & Hickley, D., 1993. "Women and children last? Class, health and the role of the maternal and child health services". *European Journal of Public Health*, 3:220-226.
- Parkerson, G. R.; Broadhead, W. E. & Tse, C. K., 1995a. "Health status and severity of illness as predictors of outcomes in primary care". *Medical Care*, 33:53-66.
- Parkerson, G. R.; Broadhead, W. E. & Tse, C. K., 1995b. "Perceived family stress as a predictor of health-related outcomes". *Archives of Family Medicine*, 4:253-260.
- Perry B. & Gesler, W., 2000. "Physical access to primary health care in Andean Bolivia". *Social Science and Medicine*, 50:1177-1188.
- Pinheiro, R. & Travassos, C., 1999. "Inequality in health care use by the elderly in three districts in the city of Rio de Janeiro". *Cadernos de Saúde Pública*, 15:487-496.
- Roos, N. P. & Shapiro, E., 1981. "The Manitoba Longitudinal Study on aging: Preliminary findings on health care utilization by the elderly". *Medical Care*, 9:644-657.
- Rosenbath, M. L.; Irvin, C. & Coulam, R. E., 1999. "Access for low-income children: Is health insurance enough?". *Pediatrics*, 103:1167-1174.
- Salber, E. J.; Greene, S. B.; Pope, C. R. & Davis, M. A., 1976. "Health status, socioeconomic status and utilization of outpatient services for members of a pre-paid group practice". *Medical Care*, 14:971-986.
- Schoen, C.; Davis, K.; Desroches, C.; Donelan, K. & Blendon, R., 2000. "Health insurance markets and income inequality: Findings from an international health policy survey". *Health Policy* 51:67-85.
- Sox, C. M.; Swartz, K.; Burstin, H. R. & Brennan, T. A., 1998. "Insurance or a regular physician. Which is the most powerful predictor of health care?". *American Journal of Public Health*, 88:364-370.
- Spivack, H. R.; Levy J. C.; Bonnano, R. A. & Cracknell, M., 1980. "Patient and providers factors associated with selected measures of quality of care". *Pediatrics*, 65:307.
- Stein, A. T., 1998. *Acesso a Atendimento Médico Continuado: Uma Estratégia para Reduzir a Utilização de Consultas não Urgentes em Serviços de Emergência*. Tese de Doutorado, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Suarez, M., 1992. *Utilização dos Serviços de Saúde Materno-Infantis na Região Sudoeste da Grande São Paulo, 1989-1990*. Dissertação de Mestrado, São Paulo: Universidade Federal de São Paulo.
- Tirkow A., 1983. "Illness behavior and action: The patient role". *Social Science and Medicine*, 17:637-646.
- Travassos, C.; Fernández, C. & Pérez, M., 1995. "Desigualdades sociais, morbidade e consumo de serviços de saúde no Brasil". *Série Estudos: Política, Planejamento e Gestão em Saúde*, 4:5-26.
- Vos, E. T., 1994. *Health Seeking Behaviour for Diarrhoea, Acute Respiratory Infections and Malaria*. Msc. Thesis, London: London School of Hygiene and Tropical Medicine.
- Wan, T. T., 1982. "Use of health services by the elderly in low-income communities". *Milbank Memorial Fund Quarterly Health and Society*, 60:82-107.
- Wan, T. T. H. & Soifer, S. J., 1974. "Determinants of physician utilization: A causal analysis". *Journal of Health and Social Behavior*, 15:999-1009.
- Wasson, J. H.; Sauvigne, A. E. & Mogielnicki, P., 1984. "Continuity of outpatient medical care in elderly men: A randomized trial". *JAMA*, 252:2413.
- Wolfe, B. L., 1980. "Children's utilization of medical care". *Medical Care*, 18:196-207.
- Wolinski, E. D., 1978. "Assessing the effects of predisposing, enabling and illness-morbidity on health services utilization". *Journal of Health and Social Behavior*, 19:384-396.
- Yuen, P. & Balarajan, R., 1989. "Unemployment and patterns of consultation with the general practitioner". *BMJ*, 298:1212-1214.
- Yuen, P.; Machin, D. & Balarajan, R., 1990. "Inequalities in health: Socioeconomic differences in self-reported morbidity". *Public Health*, 104:65-71.
- Zapka, J. & Al, E., 1989. "Breast cancer screening by mammography: Utilization and associated factors". *American Journal of Public Health*, 79:1499-1502.
- Zastowny, T. R.; Roughmann, K. J. & Caferrata, G. L., 1989. "Patient satisfaction and the use of health services. Explorations in causality". *Medical Care*, 27:705-723.